

**第1類医薬品**

レシート貼付欄

**ケナログ口腔用軟膏0.1%／説明と注意**

分類	口内炎治療薬（副腎皮質ステロイド）	
成分	トリアムシノロンアセトニド（1g中1.0mg）	
効能	<p>口腔粘膜に付着し患部を保護するとともに、抗炎症作用により患部の炎症をおさえ、以下の症状を改善します。</p> <p>口腔内：口の中の粘膜が赤くはれ、熱いもの、すっぱいものを口に入れると痛む。</p> <p>舌炎：舌が炎症をおこしてしみる。</p>	
使用方法	1日1～数回、適量を患部に塗布する。	
使用上の注意	次の人は使用しないでください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>● 感染性の口内炎が疑われる人。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガーゼなどで擦ると容易に剥がすことのできる白斑が口腔内全体に広がっている人。</li> <li>・患部に黄色い膿がある人。</li> <li>・口腔内に米粒大～小豆大の小水疱が多発している人。</li> <li>・口腔粘膜以外の口唇、皮膚にも水泡、発疹がある人。</li> </ul> </li> <li>・発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹などの全身症状がみられる人。</li> </ul>
	次のことはしないでください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 口腔内に感染を伴っている人。（歯槽膿漏、歯肉炎などの口腔内感染がある部位には使用しないでください。）</li> <li>● 5日間使用しても症状の改善がみられない人。</li> <li>● 1～2日間使用して症状の悪化がみられる人。</li> </ul>
	次の人は相談してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 口腔用のみに使用し、口腔用以外には使用しないでください。</li> <li>● 入れ歯の接着など治療以外の目的に使用しないでください。</li> </ul>
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 医師または歯科医師の治療を受けている人。</li> <li>● 本人または家族がアレルギー体質の人。</li> <li>● 薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>● 妊娠または妊娠していると思われる人。</li> <li>● 授乳中の人。</li> <li>● 患部が広範囲にある人。</li> <li>● 高齢者</li> </ul>
アドバイス等	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バランスのとれた食事や十分な睡眠をとるようにしましょう。</li> </ul>	
使用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名		
薬局住所 TEL/FAX		
担当薬剤師		